



Bitte lesen Sie hier sorgfältig die Gebrauchsinformationen zu

MANACIL

Wirkstofflösung zur Behandlung
von Zierfischen im Süßwasseraquarium

manaus-aquarium

Rügnerstrasse 73

D-64319 Pfungstadt

☎ +49 6157 1587230

info@manaus-aquarium.com

www.manaus-aquarium.com

Arzneimittel für Tiere (Süßwasserzierfische)

Darreichungsform: Wirkstofflösung zum
Zusetzen zum Aquarienwasser

Zusammensetzung wirksamer Bestandteile

µg pro ml:

Brilliantgrün 48, 4,4'-Benzyliden-Bis(n,n-
Dimethylaniline) 9,6, Acriflavin HCL 4,
Matanilgelb 0.05

Pharmazeutischer Unternehmer:

Manaus-Aquarium, Rügnerstrasse 73, D-64319
Pfungstadt

Anwendungsgebiete:

MANACIL bekämpft wirkungsvoll die
Weißpunktenkrankheit (Ichthyophthirius
multifiliis) sowie weitere einzellige Hautparasiten
bei Zierfischen wie Chilodonella, Ichthyobodo
necator, Trichodina, etc.

Krankheitssymptome:

Anzeichen für eine Erkrankung durch Parasiten
sind weiße Punkte (griesartig) auf der Haut und
auf den Flossen (Ichthyo). Bei den
verschiedenen anderen oben genannten
Erregern zeigen sich weiße oder graue
Hautbeläge bei den Fischen.

Generell stellen erkrankte Fische die
Futteraufnahme ein, klemmen die Flossen
zusammen, sind schreckhaft und scheuern sich
an Gegenständen im Aquarium.

Es ist wichtig, möglichst schnell die Fische beim
Erkennen der oben genannten
Krankheitssymptome zu behandeln, damit eine
weitere Schwächung der Tiere durch die
Parasiten verhindert wird. Wenn möglich sollte
eine mikroskopische Untersuchung zur
Diagnosestellung herangezogen werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

MANACIL darf nicht in Kombination mit anderen
Medikamenten eingesetzt werden. Falls Ihre
Fische zuvor mit einem anderen Medikament
behandelt wurden, ist ein großer Wasserwechsel
vor der Behandlung vorzunehmen.

Achten Sie auf die Wasserqualität in Ihrem
Aquarium und reduzieren Sie durch regelmäßige
Wasserwechsel die organische Belastung des
Aquariumwassers durch chemische
Abbauprodukte.

Stark verschmutzte Filter sollten vor der
Behandlung gereinigt werden, Filter und
Ausströmer zur Sauerstoffversorgung immer
laufen lassen! UV-Lampen müssen während der
Behandlung abgeschaltet werden.

Während der Behandlung des Aquariums mit
MANACIL dürfen keine aktiven Filtermedien (z.B:
Aktivkohle, Phosphatentferner, etc.) im Filter
eingesetzt werden, um Wechselwirkungen mit
gebunden Schadstoffen zu verhindern.

Ionenaustauscher (z.B zur Nitratentfernung, etc.)
sind während der Behandlung mit **MANACIL** aus
dem Wasserkreislauf des Aquariums zu
entfernen.

Wie bei allen medikamentösen Behandlungen
von Zierfischen im Aquarium sollten im Falle von
Komplikationen zum Abbruch einer Behandlung
mit **MANACIL** ein großer Wasserwechsel im
Aquarium vorgenommen werden und der
Hersteller informiert werden.

Dosierung und Anwendung:

Verwenden Sie zur Dosierung von **MANACIL** den der Packung beiliegenden Messbecher und verteilen Sie das Medikament auf der Wasseroberfläche.

1. Tag 1ml auf 40 Liter Aquarienwasser
3. Tag 1ml auf 40 Liter Aquarienwasser

Bei einem hartnäckigen Parasitenbefall kann am 5. Tag 1ml auf 40 Liter Aquarienwasser nach dosiert werden.

Wie alle Arzneimittel darf **MANACIL** nicht überdosiert werden.
Durch Krankheiten geschwächte Tiere können empfindlicher reagieren.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen:

MANACIL ist ein neues Produkt und gut verträglich.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.
Der Zierfischhalter ist angehalten, jede bisher nicht bekannte Nebenwirkung einem Tierarzt oder Apotheker und dem Hersteller mitzuteilen.

Besondere Warnhinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

In der original Verpackung aufbewahren und vor Licht und Hitze schützen, sowie frostfrei lagern.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

***MANACIL* kann färbend wirken.**

Stand der Informationen August 2009